

1. Kas ir OCUflash blue un kādam nolūkam to lieto

OCUflash blue ir konservantus nesaturoši acu pilieni, šķīdums, ar ārstniecības žibulīša (*Euphrasia officinalis*) ekstraktu. Tas paredzēts pilināšanai acīs, acu skalošanai vai acu kompresēm. Ārstniecības žibulītīm piemīt pretiekaisuma, dezinficējoša un savelkoša darbība.

Šo īpašību dēļ ārstniecības žibulītis jau ilgu laiku tiek lietots acu nomierināšanai, kā profilaktisks un atbalstošs līdzeklis neinfekcioza konjunktīvas un plakstiņu iekaisuma ārstēšanā.

OCUflash blue lieto kā šķīdumu acu skalošanai, lai izskalotu no acs kairinošās daļiņas un likvidētu acs diskomfortu, piemēram, dedzināšanas, graušanas, niezes vai svešķermeņa sajūtu acī.

OCUflash blue sastāvā nav konservantu, tāpēc šis līdzeklis ir ideāli piemērots kontaktlēcu lietotājiem un cilvēkiem ar jutīgām acīm.

Praksē OCUflash blue var lietot:

- acs skalošanai pēc tonometrijas un gonioskopijas;
- atbrīvošanai no svešķermeņiem, putekļiem un hlorēta ūdens;
- fluoresceīna šķīdumu atlieku izskalošanai;
- gļotainu un strutainu sekrētu izskalošanai;
- acu skalošanai pēc kontaktlēcu lietošanas;
- kā pirmās palīdzības līdzekli pēc viegliem konjunktīvas apdegumiem, ko izraisījušas skābes vai bāzes (balinātājs, kaļķis);
- kā palīg līdzekli konjunktivīta gadījumā;
- lai notīrītu kosmētiku no acu zonas (plakstiņiem, skropstām).

OCUflash blue var lietot pieaugušie, pusaudži un bērni. Līdzekļa drošuma dēļ to var lietot jaundzimušie, zīdaiņi, sievietes, kuras baro bērnu ar krūti.

2. Kas Jums jāzina pirms OCUflash blue lietošanas

Nelietojiet OCUflash blue, ja Jums ir alerģija pret kādu no šo zāļu sastāvā ietilpstošajām vielām.

Ja Jūs pašlaik lietojat citus acu līdzekļus, parasti ieteicams nogaidīt vismaz 5 minūtes starp dažādu līdzekļu lietošanu.

3. Kā lietot OCUflash blue

Lai nomierinātu acis vai uzmantojot kā palīg līdzekli neinfekcioza konjunktīvas un plakstiņa iekaisuma gadījumā, ieteicamā deva ir 1-2 pilieni 1-4 reizes dienā.

Acu skalošanai šķīdumu izmanto, līdz ir panākta atbrīvošanās no kontaminanta vai svešķermeņa. OCUflash blue var lietot ilgstoši.

Kontaktlēcu lietotāji

OCUflash blue var lietot kontaktlēcu lietošanas laikā.

Piesardzības pasākumi pirms lietošanas

1. Nomazgājiet rokas un ērti apsēdieties vai stāviet.
2. Noskrūvējiet pudelītei vāciņu.



3. Turiet pudelīti uz leju starp īkšķi un citiem pirkstiem.
4. Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams izpilināt pirmo pilienus ārpus acs, uzmanīgi saspiežot pudelīti, jo, spiežot pudelīti spēcīgi un nevienmērīgi, var izdalīties lielāks šķīduma tilpums.
5. Ar pirkstu saudzīgi pavelciet uz leju bojātās acs apakšējo plakstiņu.




6. Novietojiet pipetes galu tuvu acijm bet tā, lai tas nepieskartos acij vai tai pieguļošajām sejas daļām.

7. Saudzīgi saspiediet pudelīti, lai acī iekļūtu tikai 1-2 pilieni vai vairāk, ja aci ir nepieciešams skalot. Tad atlaidiet apakšējo plakstiņu un lēni aizveriet aci, lai OCUflash blue vienmērīgi izkliedētos pa acs virsmu.

Priekš nākamā piliena ļaujiet gaisam ieplūst atpakaļ plastmasas pudelē, lai tā atgrieztos sākotnējā stāvoklī, un pēc tam turpiniet to lietot acij, kā ieteikts.

Lūdzam ņemt vērā, ka starp saspiešanu un pilienu izdalīšanos var paiet dažas sekundes. Pudelīti nedrīkst saspiegt pārāk cieši.



8. Ja nepieciešams, procedūra jāatkārto ar otru aci.



9. Pēc lietošanas pudelīte vienu reizi jāsakrata uz leju, nepieskaroties pipetes galam, lai atbrīvotu pipeti no tajā atlikušā šķidruma. Tas nepieciešams tāpēc, lai nodrošinātu acu pilienu sterilitāti un nākamā pilienu vieglāku iepilināšanu nākamajā lietošanas reizē.

10. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizskrūvējiet pudelītes vāciņu.

4. Kādas ir iespējamās blakusparādības

Retos gadījumos tūlīt pēc lietošanas var būt jūtama viegla, pārejoša dedzināšanas sajūta vai alerģiska reakcija pret kādu no vielām, kas ir šī līdzekļa sastāvā.

Ja rodas jebkurš no šādiem simptomiem vai citas neparastas reakcijas, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

5. Ko OCUflash blue satur

Nātrija hlorīds, 7 mg uz 1 ml, dinātrija edetāta dihidrāts, kālija hlorīds, magnija hlorīda heksahidrāts, polisorbāts 80, ārstniecības žibulīša (*Euphrasia officinalis*) ekstrakts, nātrija borāts, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.

6. Kā uzglabāt OCUflash blue un cita informācija

Uzglabāt pudelīti oriģinālajā iepakojumā 25 °C temperatūrā.

Sargāt no aukstuma un sala.

Uzglabāt šo līdzekli bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot izstrādājumu pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz etiķetes vai kastītes blakus smilšu pulksteņa ikonai. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot OCUflash blue pēc tam, kad kopš pudelītes atvēršanas pagājuši 3 mēneši.

Iepakojumu izmērs: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovākija

Tel.: +421 2 4333 3786

Fakss: +421 2 4363 8743

E-pasta adrese:

unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



2265



Šī lietošanas instrukcija pēdējoreiz atjaunināta 2020. gada aprīlis.