

OCUflash®

Chlorid sodný 7 mg/ml
Očná roztoková instilácia

1. Čo je OCUflash a na čo sa používa

OCUflash je špeciálny očný (isotonický, pufrovaný) roztok s prídavkom extraktu očianky lekárskej. Je určený pre použitie k výplachom alebo kvapkaniu do oka. Výťažky očianky lekárskej pôsobia v oku protizápalovo, dezinfekčne a adstringentne (sťahujúco). Tieto charakteristické vlastnosti očianky sa už dlhodobo využívajú k upokojeniu očí, k prevencii a k podporenej liečbe neinfekčných zápalov mihalníc a spojoviek.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete OCUflash

OCUflash sa nesmie používať pri precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek.

OCUflash môžu používať dospelí, deti a mladiství. Vzhľadom k bezpečnosti prípravku je možné ho podávať i novorodencom, dojčatám, tehotným ženám a dojčiacim matkám.

Pokiaľ sú súčasne používané i iné očné instilácie alebo očná masť, je vhodné ich aplikovať do oka najskôr za 5 minút po aplikácii prípravku OCUflash.

3. Ako používať OCUflash

OCUflash je ideálny očný roztok pre výplach dráždivých častíc alebo chemikálií z oka. Bez rady lekára môže byť použitý k jednoduchému krátkodobému výplachu, ďalej ku kvapkaniu do očí alebo k obkladom mihalníc. Prípravok sa používa pri neprijemných pocitoch v oku ako je pálenie, rezanie, svrbenie a pocit cudzieho telieska v oku. V praxi je OCUflash ideálne použiť:

1. k výplachom oka po tonometrii a gonioskopii,
2. na vymývanie oka, k odstráneniu cudzích teliesok, prachu a chlórovej vody,
3. k odplaveniu zvyškov fluoresceínových roztokov,
4. k vymývaniu hlienistých a hnisavých sekrétov,
5. k výplachom oka po nosení tvrdých kontaktných šošoviek,
6. ako prvá pomoc po ľahkom poleptaní spojoviek a očí kyselinami a zásadami (vápnom, maltou),
7. ako podporný prostriedok pri niektorých, hlavne neinfekčných zápaloch spojoviek, chronických zápaloch spojoviek.
8. je vhodné ho použiť pri odstraňovaní kozmetických prípravkov z okolia oka (viečok, rias).

Dávkovanie:

K upokojeniu očí a k podpornej liečbe neinfekčných zápalov spojoviek a mihalníc vkvapnúť do dolného spojivkového vaku 1-2 kvapky 1-4x denne. Pri výplachu akéhokoľvek cudzieho telieska z oka aplikujeme roztok až do doby odstránenia cudzorodej látky či cudzích teliesok, poprípade do vymiznutia problémov.

Upozornenie pred aplikáciou

Po otvorení je OCUflash pripravený na podanie do oka. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastickej fľaštičky kvapne do dolného spojivkového vaku predpísaný počet kvapiek. Množstvo aplikovaného roztoku závisí od spôsobu použitia. Kvapkajte alebo vypláchnite postihnuté oko roztokom podľa potreby (množstvo vytekajúceho roztoku kontrolujete stlačením fľaštičky). Pri zápaloch mihalníc je možné roztok použiť i k obkladom. Pri aplikácii sa kvapkadlo nemá dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe.

Upozornenia:

Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú viac ako dva dni, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

OCUflash neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel, obsluhu strojov a práci vo výškach, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť, avšak pri aplikácii do spojovkového vaku môže ojedinele dôjsť prechodne k rozmazanému videniu a preto tieto činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť je možné vykonávať až po ukončení tohto prechodného účinku.

Pri náhodnom požití prípravku dieťaťom kontaktujte lekára.

Pacient nesmie súčasne s používaním prípravku nosiť mäkké kontaktné šošovky (hlavne hydrofilné). Podľa možnosti by sa po dobu liečenia nemali nosiť ani tvrdé kontaktné šošovky, alebo aspoň pred aplikáciou je potrebné, aby si ich pacient vždy vybral a znova nasadil najskôr za 20 minút po nakvapkaní prípravku.

4. Aké sú možné vedľajšie účinky

OCUflash je veľmi dobre znášaný. Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie. Môže sa vyskytnúť reakcia precitlivenosti.

V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných nezvyčajných reakcií sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik.

Interakcie: Nie sú doposiaľ známe.

5. Čo OCUflash obsahuje

Chlorid sodný 7 mg v 1 ml

Pomocné látky: benzalkóniumchlorid 0,04mg v 1ml (0,004%), dihydrát edetanu disodného, chlorid draselný, hexahydrát chloridu horečnatého, polysorbát 80, očianková tinktúra, bórax, hydroxid sodný, čistená voda.

6. Ako uchovávať OCUflash a ďalšie informácie

Uchovávajúte pri teplote do 25 °C.

Chrániť pred chladom a mrazom.

Prípravok uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Prípravok nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pri

ikone presýpacích hodín. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní.

Balenie:

1 x 10ml, 2 x10ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Dátum poslednej revízie: Apríl 2020